

## Língua Portuguesa

- 1- No período abaixo, a oração em destaque é classificada como:

"O técnico Dunga prefere jogadores **que obedecem a seus esquemas**".

- a) Oração subordinada adverbial comparativa.  
 b) Oração subordinada adjetiva restritiva.  
 c) Oração subordinada adjetiva explicativa.  
 d) Oração subordinada adverbial proporcional.

- 2- O período abaixo é considerado:

"Estudei muito, portanto serei promovido."

- a) Período simples.  
 b) Período composto por subordinação.  
 c) Período composto por coordenação.  
 d) Período composto por conotação.

- 3- No período abaixo, a oração em destaque é:

"O importante é **que ela saiu da depressão**".

- a) Oração subordinada substantiva predicativa.  
 b) Oração coordenada aditiva.  
 c) Oração subordinada substantiva completiva nominal.  
 d) Oração coordenada conclusiva.

As questões de números 4 a 6 referem-se ao texto abaixo transcrito:

Sete Quedas por nós passaram  
 E não soubemos amá-las  
 E todas sete foram mortas  
 E todas sete somem no ar,  
 Sete fantasmas, sete crimes  
 Dos vivos golpeando a vida  
 Que nunca mais renascerá.  
 (Carlos Drummond de Andrade)

- 4- Por **fantasmas**, no texto, concluímos que são:

- a) entes que aparecem aos vivos.  
 b) imagens da culpa que iremos levar conosco.  
 c) imagens dos que não mais existem.  
 d) frutos da imaginação doentia do ser humano.

- 5- A repetição da conjunção **e** tem a função de marcar:

- a) que existe uma sequência cronológica dos fatos.  
 b) uma repetição exagerada do conectivo.  
 c) que existe uma implicação de consequência dos dois últimos fatos em relação ao primeiro.  
 d) que existe uma coordenação entre as três orações.

- 6- No trecho:

"E todas sete foram mortas  
 E todas sete somem no ar"

A repetição **todas sete** se justifica:

- a) para realçar que a perda foi parcial.  
 b) para indicar o número de quedas que há no rio Paraná.  
 c) pela simples necessidade de concordância nominal.  
 d) para representar todo o conjunto das quedas que some.

- 7- Em:

"Cravei-lhe os dentes na face, com todas as forças que eu possuía", a palavra "que" tem a função morfosintática de:

- a) pronome relativo – sujeito.  
 b) conjunção subordinada – complemento nominal.  
 c) pronome relativo – objeto direto.  
 d) conjunção subordinada – complemento verbal.

8- O termo destacado na oração abaixo é:

“Perguntei-**lhe** se iria hoje.”

- a) complemento nominal.
- b) objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) sujeito simples.

9- A oração destacada é:

“**Terminado o jogo**, todos vaiaram o juiz”.

- a) oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio.
- b) oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio.
- c) oração subordinada substantiva completiva nominal.
- d) oração subordinada substantiva objetiva direta.

10- Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente grafadas:

- a) tangerina – cafageste – jeca – maisena.
- b) quisesse – pusesse – enxente – poetisa.
- c) atravez – piche – analisar – agiota.
- d) obsessão – acessório – assessorando – assessor.

### **Conhecimentos Específicos**

- 11- Qual a alternativa que aponta traçado de audiometria sugestivo para PAIR?
- que atinja até 70 dB(A) em 500 Hz, 1KHz e 2 KHz e até 40 dB(A) entre 3,4 e 6 KHz.
  - que atinja até 40 dB(A) em 500 Hz, 1KHz e 2 KHz e até 70dB(A) entre 3,4 e 6 KHz.
  - que atinja até 40 dB(A) em 500 Hz, 1KHz e 2 KHz e até 70dB(A) entre 3,4 e 6 KHz.
  - que atinja até 40 dB em 500 Hz, 1KHz e 2 KHz e até 70dB(A) entre 3, 4 e 6 KHz.
- 12- Uma vez confirmado um caso de PAIR, a conduta mais correta é:
- afastar o trabalhador da exposição e emitir a CAT após o início do benefício previdenciário.
  - emitir a CAT com a data do dia seguinte ao da realização da audiometria.
  - afastar o trabalhador emitir a CAT no dia útil seguinte ao do afastamento.
  - emitir a CAT no dia útil seguinte ao do diagnóstico de PAIR.
- 13- Em um quadro de palidez cutânea, mialgia e artralgia, cólicas abdominais e paralisia espástica, pode-se pensar em contaminação por:
- benzeno.
  - chumbo.
  - manganês
  - xileno.
- 14- Quando uma medição ocupacional de ruído for apontada em TWA, isto significa que:
- o tempo de medição foi exatamente de 8 horas e o incremento de duplicação de dose foi "5".
  - se refere à média do nível do ruído durante um determinado período de tempo, utilizando qualquer incremento de dose, com exceção do "3".
  - se refere à média do nível do ruído durante um período de 8 horas, utilizando qualquer incremento de dose, com exceção do "3".
  - o nível médio de exposição convertido para um jornada padrão de 8 horas, para fins de comparação com o limite de tolerância de 85 dB(A).
- 15- Em caso de audiometria sugestiva de PAIR, a exposição a qual das substâncias abaixo é passível de provocar o mesmo tipo de traçado?
- aminoglicosídeos (espreptomina, gentamicina, etc) e diuréticos.
  - benzeno, cetonas, álcool isopropílico.
  - sulfeto de hidrogênio (H<sub>2</sub>S), ácido sulfúrico, formaldeído.
  - tricloroetileno, tolueno, xileno.

Leia o disposto adiante e responda as questões de 16 a 19.

Durante as avaliações ocupacionais sistemáticas realizadas em uma pedreira, um médico do trabalho observou os seguintes achados. Todos os trabalhadores analisados trabalhavam há mais de 12 anos na empresa e estiveram neste período exposto à sílica. Considere o número médio de trabalhadores em cada um dos anos como 100.

Ano	Casos diagnosticados por ano	Casos desligados por aposentadoria ou morte.
2003	8	0
2004	5	0
2005	8	4
2006	3	7
2007	3	5
2008	2	8

16- Conforme o histórico anterior, podemos afirmar que.

- a) A incidência de silicose nesta empresa em 2006 foi de 4%.
- b) A prevalência de silicose nesta empresa em 2005 foi de 12%.
- c) A incidência de silicose nesta empresa em 2005 foi de 4%.
- d) A prevalência de silicose nesta empresa em 2007 foi de 11%.

17- Com relação à silicose, é correto afirmar que:

- a) é possível surgirem casos de mesotelioma de pleura em alguns destes trabalhadores, por ser este tipo de câncer frequente na silicose.
- b) a sílica amorfa é o principal fator etiológico da silicose.
- c) o tratamento adequado pode levar à regressão total da doença.
- d) o histórico ocupacional e a realização do raio x de tórax foram pontos fundamentais para o diagnóstico dos casos.

18- A melhor forma de prevenção da silicose no ambiente de trabalho é:

- a) a umidificação do processo produtivo.
- b) a utilização de protetor respiratório com filtro do tipo PFF1.
- c) a utilização de protetor respiratório com filtro do tipo PFF2.
- d) a utilização de protetor respiratório com filtro do tipo PFF3.

19- Na observação de quadro clínico de um destes trabalhadores com adinamia, perda de peso, febre baixa e tosse persistente, o raciocínio levaria a pensar em:

- a) silicoma.
- b) tuberculose pulmonar.
- c) pneumonia bacteriana intersticial.
- d) mesotelioma de pleura.

- 20- A fórmula "  $0,7 \text{ TBN} + 0,1 \text{ TBS} + 0,2 \text{ TG}$  " é utilizada para medir:
- IBUTG com carga solar.
  - IBUTG sem carga solar.
  - temperatura isolada com carga solar.
  - temperatura úmida ambiental.
- 21- Pedreiro, há 2 semanas apresenta ulceração persistente no dorso na mão direita, iniciada após escoriação. O agente possivelmente implicado no desencadeamento deste quadro é:
- cobalto.
  - chumbo.
  - manganês.
  - cromo.
- 22- Quanto à exposição a fumos metálicos de manganês:
- o monitoramento biológico deve ser realizado a cada ano, com dosagem de manganês urinário.
  - o monitoramento biológico pode ser realizado a cada dois anos, com dosagem de manganês sanguíneo.
  - o monitoramento biológico deve ser realizado a cada seis meses, com dosagem de manganês sanguíneo.
  - o monitoramento biológico deve ser realizado a cada seis meses, com dosagem de ALA-U.
- 23- Para a devida informação das condições de trabalho de um determinado colaborador, com vistas, principalmente, à comprovação do trabalho em regime de insalubridade e/ou periculosidade, a partir de 1 de janeiro de 2004, o documento exigido é o:
- SB-40.
  - DSS-8030.
  - PPP.
  - CAT.
- 24- No tratamento das intoxicações agudas a organofosforados como conduta:
- deve-se administrar sulfato de atropina.
  - pode-se fazer lavagem gástrica utilizando solução de bicarbonato de sódio a 5%(m/v), adicionada de carvão ativado.
  - deve-se provocar vômitos quando da ingestão de produtos formulados com solventes orgânicos.
  - nunca administrar laxativos oleosos, leite, alimentos e produtos gordurosos.
- 25- Com relação à RENAST, é competência do SUS no campo das ações de saúde do trabalhador, exceto:
- assistência ambulatorial e hospitalar aos doentes.
  - inspeção dos locais de trabalho.
  - assistência farmacêutica.
  - reabilitação profissional.

- 26- Quanto ao mecanismo de ação dos agrotóxicos fosforados orgânicos, é correto afirmar que:
- interagem com os canais de sódio da membrana da célula nervosa.
  - provocam fibrose pulmonar progressiva com bronquite terminal proliferativa.
  - atuam como inibidores reversíveis da colinesterase.
  - atuam como inibidores irreversíveis da colinesterase.
- 27- Na possibilidade da existência de trabalho em turnos, é correto afirmar que:
- os turnos alternantes são sempre piores que os fixos.
  - o melhor horário é o da madrugada depois o vespertino.
  - interrupções ou cochilos na madrugada são recomendados.
  - a resposta metabólica ao esforço independe do horário de trabalho, mantendo a mesma produtividade.
- 28- Quanto à segurança do trabalho realizado com solda, deve-se observar:
- se há correta ventilação do ambiente.
  - se o trabalhador obedece a sequência "fonte de alimentação elétrica-máquina soldadora- operador" para se afastar do arco elétrico.
  - se há respeito às regras de não fumar.
  - todas estão corretas.
- 29- De acordo com a Resolução n.º 1.488/98 do Conselho Federal de Medicina, para o estabelecimento donexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, o médico NÃO deve considerar:
- o estudo do local de trabalho e a organização do trabalho.
  - a história clínica e ocupacional.
  - o depoimento e a experiência dos trabalhadores.
  - os custos de uma intervenção para melhorar o ambiente de trabalho.
- 30- Os efeitos não dependentes de dose das radiações ionizantes devem ser acompanhados com:
- dosimetria mensal com filmes de lapela.
  - dosimetria semestral com filmes de lapela.
  - hemograma semestral com contagem de plaquetas.
  - hemograma semestral com contagem de reticulócitos.
- 31- Em geral, a construção das escalas de trabalho em turnos alternantes deve obedecer:
- sequência de horários no sentido horário.
  - sequência de horários no sentido anti-horário.
  - depende da idade do trabalhador.
  - depende da produtividade.

- 32- Para fins de atendimento à lei de cotas, o déficit visual passível de enquadramento corresponde a:
- a) déficit visual menor que 20/200 na escala de Snellen no melhor olho, mesmo com correção.
  - b) deficiência visual em ambos os olhos, mesmo que passível de correção.
  - c) visão nula em um olho e visão normal no outro olho.
  - d) visão nula em um olho e visão subnormal no outro olho, mesmo com correção.
- 33- O monitoramento biológico periódico na exposição ao xileno deve ser feito:
- a) na urina, ao final de jornada.
  - b) na urina de 24 horas, quando for o dia de maior exposição.
  - c) hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos semestralmente.
  - d) na urina no início da jornada de trabalho.
- 34- A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho é obrigatória:
- a) quando o afastamento de trabalhador é superior a quinze dias.
  - b) sempre que há qualquer tipo de afastamento.
  - c) quando há afastamento de um a quinze dias.
  - d) para todo acidente de trabalho, independente de haver afastamento ou não.
- 35- Conforme os critérios do INSS, quanto à aposentadoria especial, é correto afirmar que:
- a) o pagamento de adicional de periculosidade implica em enquadramento para aposentadoria especial.
  - b) condições ergonômicas desfavoráveis ensejam aposentadoria especial.
  - c) a partir de 6 de março de 1997, umidade e eletricidade deixaram de ser enquadradas.
  - d) a exposição ao risco biológico é sempre enquadrável.
- 36- Conforme a Lei Federal 8.213/91, trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do afastamento por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, têm direito à estabilidade no emprego por um período de:
- a) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença.
  - b) 12 meses, a partir da cessação do benefício previdenciário concedido.
  - c) 12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento das atividades no trabalho.
  - d) 12 meses, após a alta do médico assistente do segurado.

- 37- As empresas brasileiras, conforme a lei de cotas, devem dispor de, pelo menos:
- 10% de suas vagas, a partir de 1.000 empregados, para reabilitados.
  - 8% de suas vagas, a partir de 500 empregados, para deficientes.
  - 7% de suas vagas, a partir de 1.500 empregados, para reabilitados.
  - 2% de suas vagas, a partir de 100 empregados, para deficientes.
- 38- Gengivite em garimpeiros pode ser produzida por:
- costume de guardar ouro na boca.
  - exposição a poeiras não respiráveis.
  - por inalação direta ao monóxido de carbono na queima de ouro, tanto por exposição direta, quanto por via sistêmica.
  - por inalação direta de mercúrio na queima de ouro, tanto por exposição direta quanto por via sistêmica.
- 39- Dentre as seguintes assertivas, qual está INCORRETA.
- o trabalho com radiações ionizantes exige exames hematológicos semestrais.
  - os obesos podem trabalhar em ambientes de altas temperaturas.
  - o trabalho em ambiente ruidoso exige audiometria prévia.
  - o trabalho em altas temperaturas necessita de aclimação.
- 40- Na legislação atual, quanto à exposição ao ruído ocupacional, o nível de ação é de:
- 85 dB(A).
  - 82 dB(A).
  - 88 dB(A).
  - 80 dB(A).
- 41- A avaliação da exposição do trabalhador ao calor excessivo no ambiente de trabalho leva em conta os seguintes elementos, EXCETO:
- umidade relativa do ar.
  - temperatura do ar.
  - o tipo do exercício físico executado durante o trabalho.
  - temperatura corporal.
- 42- Quanto aos exames complementares apontados na seção III do PPP, é CORRETO afirmar que:
- devem ser disponibilizados ao empregador para preenchimento do PPP.
  - somente são disponibilizados após solicitação por escrito emitida por decisão judicial.
  - nunca são fornecidos, conforme Resolução 1.715 do CFM.
  - não deve ser fornecido ao empregador, sendo escrito pelo próprio médico no formulário do PPP.

- 43- Não guarda relação com a atividade profissional em condições hiperbáricas:
- doença descompressiva.
  - osteonecrose asséptica.
  - osteoartrose múltipla.
  - Intoxicação pelo oxigênio.
- 44- Conforme a NR 7 da portaria 3.214/78 do MTE, quando houver exposição a aerodispersóides fibrinogênicos:
- a telerradiografia do tórax e a espirometria devem ser realizadas no admissional e anualmente.
  - a telerradiografia do tórax deve ser realizada no admissional e anualmente, enquanto a espirometria no admissional e bianualmente.
  - a telerradiografia do tórax e a espirometria devem ser realizadas no admissional e bianualmente.
  - a telerradiografia do tórax deve ser realizada no admissional e bianualmente, enquanto a espirometria no admissional e anualmente.
- 45- Quanto à PAIR, aponte a condição INCORRETA.
- é quase sempre bilateral.
  - é irreversível.
  - é uma perda auditiva condutiva.
  - é a lesão das células do órgão espiral.
- 46- Conforme o Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde / Ministério da Saúde, o qual traz a Classificação das doenças segundo sua relação com o trabalho, asbestose é apontada como:
- grupo I de Schilling.
  - grupo II de Schilling.
  - grupo III de Schilling.
  - grupos II e III de Schilling.
- 47- Conforme o Decreto Municipal nº 9762, de 23 de abril de 2004 de Bauru, é possível o afastamento do trabalho para licença saúde:
- o servidor que for constatado incapacitado por seu médico.
  - o servidor avaliado pela perícia médica da FUNPREV, após concessão superior a 15 dias pelo Médico do Trabalho da Prefeitura.
  - o servidor portador de doença transmissível.
  - nenhuma das anteriores.
- 48- Na possibilidade de se encontrar um trabalhador portador de Síndrome de Raynaud clássica, deve-se impedir o trabalho quando houver:
- calor excessivo.
  - vibrações localizadas de alta frequência.
  - ruído.
  - radiações não ionizantes.

- 49- Pode guardar relação com o trabalho:
- a) transtorno de pânico.
  - b) agorafobia.
  - c) estresse pós traumático.
  - d) transtorno da inteligência.
- 50- Conforme o Decreto Municipal de Bauru nº 9.928, de 23 de dezembro de 2004, a ajuda de custo para filhos portadores de deficiência física ou mental incapacitante permanente e definitiva:
- a) não pode cessar, enquanto houver atestado médico apontando a situação.
  - b) poderá cessar imediatamente se a perícia médica apontar a cessação da incapacidade.
  - c) poderá cessar se a perícia médica apontar a cessação da incapacidade, no mês subsequente.
  - d) poderá cessar se a perícia médica apontar a cessação da incapacidade, no ano subsequente.