



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

### 048. PROVA OBJETIVA

#### Médico Pediatra Plantonista

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

**01.** Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

**02.** O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

**03.** Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

**04.** Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
- A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...

- (A) sem tamanho / normais
- (B) enormes / excepcionais
- (C) imprudentes / perfeitas
- (D) despropositadas / estandardizadas
- (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

**05.** Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

**06.** A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

**07.** Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

**08.** Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

**09.** Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. *Folha de S. Paulo*, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

## POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:

- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
- (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
- (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
- (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
- (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.

12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com

- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
- (B) dislipidemia.
- (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
- (D) pais hipertensos.
- (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.

13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
- (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
- (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
  - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
  - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
  - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
  - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
  - (B) Silicose.
  - (C) Tuberculose.
  - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
  - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
  - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
  - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
  - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
  - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
  - (B) deve ser administrada ao nascer.
  - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
  - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
  - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
  - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
  - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
  - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
  - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
  - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
  - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
  - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
  - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
  - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
  - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
  - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

## ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
- (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
- (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
- (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
- (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
  - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
  - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
  - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
  - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
- (B) na Venezuela.
- (C) na Colômbia.
- (D) na Bolívia.
- (E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão \_\_\_\_\_, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Recém-nascido nasceu de parto normal, com idade gestacional de 36 semanas e 2 dias e peso de 2 145 gramas (percentil = 5). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse recém-nascido é classificado como:
- (A) muito prematuro, muito baixo peso, adequado para idade gestacional.
  - (B) prematuro tardio, baixo peso, pequeno para idade gestacional.
  - (C) prematuro tardio, baixo peso, adequado para idade gestacional.
  - (D) termo, muito baixo peso, pequeno para idade gestacional.
  - (E) pós-data, baixo peso, adequado para idade gestacional.
32. Em relação ao teste de triagem auditiva neonatal, assinale a alternativa correta.
- (A) Como em mais de 75% dos portadores de surdez congênita permanente se identifica algum fator de risco, os testes de triagem auditiva são indicados apenas para os recém-nascidos que preencherem alguns desses critérios.
  - (B) A triagem auditiva neonatal envolve o uso de avaliações objetivas e subjetivas e é realizada por meio do BERA (exame do potencial evocado auditivo do tronco encefálico).
  - (C) As emissões otoacústicas evocadas e o BERA são testes que detectam a integridade estrutural da via auditiva e, quando são normais, a audição pode ser considerada normal.
  - (D) As emissões otoacústicas não detectam afecções retrococleares, que podem ocorrer em crianças asfixiadas ou com hiperbilirrubinemia.
  - (E) Os testes de triagem empregados no período neonatal não dependem da colaboração da criança e não são influenciados por alterações na orelha média (presença de cerúmen ou vérnix no conduto auditivo).
33. Recém-nascido com 3 semanas de vida, nascido de parto normal domiciliar, é trazido ao pronto-socorro com história de coriza espessa serossanguinolenta há 2 semanas e, desde o dia anterior, apresenta irritabilidade e choro ao ser manipulado. Ao exame, está em regular estado geral, desnutrido, descorado 2+/4, com várias lesões bolhosas, de conteúdo serossanguinolento, em halo eritematoso, acometendo tronco, palmas de mãos e plantas de pés. Chora ao ser manipulado, e não movimentava os membros superiores. A principal hipótese diagnóstica é:
- (A) síndrome da pele escaldada.
  - (B) infecção pelo *Streptococcus* do grupo B.
  - (C) herpes simples disseminado.
  - (D) sífilis congênita.
  - (E) epidermólise bolhosa.
34. Mãe se queixa de que seu bebê de 20 dias de vida chora muito, que está em aleitamento materno exclusivo e quer mamar de hora em hora. Refere que cerca de 20 minutos após as mamadas ele apresenta muita cólica. Nega regurgitações ou outras queixas. O exame físico é normal e o ganho de peso é adequado. A mãe apresenta fissuras mamárias bilateralmente. De acordo com a suspeita diagnóstica, a primeira conduta deve ser
- (A) introduzir complemento com leite de vaca.
  - (B) suspender leite de vaca da dieta materna.
  - (C) prescrever antiespasmódico.
  - (D) prescrever procinético.
  - (E) verificar e orientar a técnica da mamada.
35. No final de 2014, o Ministério da Saúde incluiu a vacina tríplice acelular tipo adulto contra a coqueluche no calendário de imunizações das gestantes. Essa medida visa
- (A) diminuir o número de casos da doença entre os adultos jovens.
  - (B) reduzir o número de óbitos entre as gestantes.
  - (C) evitar formas graves da doença entre as gestantes.
  - (D) reduzir a transmissão vertical da doença.
  - (E) garantir a proteção indireta dos recém-nascidos e lactentes jovens.
36. A ocorrência de síncope após a vacina contra o Papilomavírus humano (HPV)
- (A) é relacionada ao efeito vasovagal decorrente de ansiedade e medo, e a sua ocorrência não contraindica as doses subsequentes.
  - (B) está associada à vacinação combinada contra o HPV e a hepatite B, portanto essas vacinas devem ser aplicadas com um intervalo de, no mínimo, 15 dias.
  - (C) é um evento relativamente comum, causado por hipersensibilidade ao diluente presente na vacina, portanto a sua ocorrência contraindica a aplicação das doses subsequentes.
  - (D) é um evento raro, que indica hiper-reatividade aos componentes da vacina, o que contraindica as doses subsequentes.
  - (E) é um evento raro e está relacionado à reatividade aos vírus presentes na vacina quádrupla, portanto recomenda-se a vacina bivalente nas doses subsequentes.

37. O crescimento compensatório (catch up) é caracterizado por velocidade acelerada no crescimento e permite que crianças nascidas prematuras consigam equiparar o seu crescimento ao das crianças nascidas a termo, geralmente nos dois primeiros anos de vida. Qual índice antropométrico costuma ser o primeiro a se equiparar entre os prematuros e os nascidos a termo?
- (A) O comprimento para a idade.
  - (B) O comprimento para o peso.
  - (C) O peso para a idade.
  - (D) O índice de massa corporal.
  - (E) O perímetro cefálico para a idade.
38. Uma criança de 1 ano de idade recebeu exclusivamente leite materno até os 6 meses de vida. Após a introdução da alimentação complementar, vem apresentando desaceleração na curva de ganho de peso e de comprimento. Não apresenta sinais clínicos que sugiram a presença de outras doenças. Em relação à alimentação dessa criança, está correto orientar:
- (A) evitar a oferta de excesso de sucos nos intervalos das refeições.
  - (B) iniciar a oferta pelos alimentos de que a criança menos gosta, deixando os alimentos preferenciais para o final da refeição.
  - (C) para aumentar a oferta calórica, devem ser oferecidos lanches saudáveis (frutas e leite) em quantidades maiores e em menores intervalos.
  - (D) estimular a aceitação alimentar da criança por meio de brincadeiras e gratificações caso ela aceite bem a refeição.
  - (E) a oferta mais frequente do leite materno, que é o alimento preferencial dessa criança.
39. Adolescente feminina, de 11 anos, está preocupada porque é "muito baixinha". Sua altura corresponde ao percentil 5 e seu estágio puberal é M1P1. Nesse caso, é correto explicar para a adolescente que o pico da velocidade de crescimento vai ocorrer
- (A) quando ocorrer a menarca.
  - (B) após a menarca.
  - (C) quando aparecer o broto mamário (M2).
  - (D) quando o tecido mamário aumentar além da aréola (M3).
  - (E) quando aparecer a pilificação (P2).
40. Lactente de 15 meses é trazido ao pronto-socorro com história de 2 dias de febre alta, vômitos e diarreia sangüinolenta. Hoje apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada, na ausência de febre. Com base nesse quadro clínico, qual deve ser o agente etiológico?
- (A) *Escherichia coli* enterotoxigênica.
  - (B) *Staphylococcus aureus*.
  - (C) *Shigella* sp.
  - (D) *Clostridium difficile*.
  - (E) *Giardia lamblia*.
41. Criança de 3 anos é trazida para a consulta pediátrica com diarreia há 3 semanas, com perda de 300 g nesse período. O exame físico é normal e o exame protoparasitológico e a cultura de fezes resultaram negativas. No manejo dietético desse paciente, além da redução da oferta da lactose, está indicado:
- (A) aumentar o aporte de açúcares simples.
  - (B) reduzir a oferta de gorduras.
  - (C) reduzir o aporte calórico.
  - (D) aumentar a oferta de ácidos graxos insaturados.
  - (E) reduzir o aporte proteico.
42. Menino de 8 anos é trazido com queixa de dor em hipocôndrio direito recorrente há 6 meses. A dor ocorre uma vez por semana, geralmente antes de se alimentar. Nega despertar noturno devido à dor. A mãe dá analgésico e chá para melhorar. Nega outros sintomas associados. Exame físico normal. Nesse relato clínico, identifica-se um fator de alerta para ampliar a investigação da dor abdominal recorrente. Esse fator de alerta é
- (A) a localização em hipocôndrio.
  - (B) a duração de 6 meses.
  - (C) a frequência semanal.
  - (D) o horário preferencial da dor.
  - (E) a necessidade de analgésico.
43. Criança de 3 anos deu entrada no pronto-atendimento com história de 1 dia de febre (38,5 °C), tosse seca, rouquidão e falta de ar. Ao exame, está dispneica, com presença de estridor e retrações intercostais. A saturação em ar ambiente é de 91%. A conduta inicial é:
- (A) inalação com soro fisiológico, alta e retorno se piora clínica.
  - (B) corticoide oral, inalações com fenoterol, alta e retorno se necessário.
  - (C) dexametasona intramuscular, oxigênio umidificado e manter em observação clínica por pelo menos 4 horas.
  - (D) inalação com adrenalina racêmica, oxigênio umidificado e alta quando melhorar o desconforto respiratório.
  - (E) internação hospitalar com hidrocortisona endovenosa, oxigenioterapia e inalações com brometo de ipratrópio.

44. Menina de 9 anos apresenta história de tosse produtiva há 10 dias, rinorreia purulenta e febre de 38,5 °C há 2 dias. De acordo com a hipótese diagnóstica, a conduta deve ser:
- orientar sintomáticos e retorno se a febre persistir por mais 48 horas.
  - introduzir antibioticoterapia.
  - solicitar radiografia de seios da face.
  - solicitar tomografia de seios da face.
  - solicitar nasofibroscopia.
45. Criança de 2 anos com história de 5 dias de febre alta, anorexia, sialorreia e irritabilidade. Ao exame, está em regular estado geral, febril, hidratada, com hiperemia de orofaringe e presença de lesões aftosas em gengivas e palato. O provável agente envolvido é o
- herpes simples.
  - estreptococo alfa-hemolítico.
  - pneumococo.
  - adenovírus.
  - parainfluenza.
46. Criança de 1 ano apresenta episódios recorrentes de crises de sibilância desde os 6 meses de vida, após ter entrado na creche. As crises são mensais e desencadeadas por episódios de infecção de vias aéreas superiores. Quando é levada ao pronto-socorro, são prescritas inalações com broncodilatador e prednisolona (usou 4 vezes em 6 meses) e foi internada 2 vezes por esse motivo. No período intercítico, costuma apresentar tosse seca noturna. Nega outros sintomas ou antecedentes familiares patológicos. O exame físico é normal.
- A conduta nesse momento é
- investigar refluxo gastroesofágico.
  - suspender leite de vaca por 6 meses.
  - solicitar sódio e cloro no suor.
  - introduzir corticoide inalatório profilático.
  - prescrever antileucotrieno oral.
47. Lactente de 4 meses, previamente hígido, com história de 3 dias de coriza hialina e tosse, é trazido ao pronto-socorro por apresentar piora da tosse e cansaço. Nega febre. Ao exame físico, está em bom estado geral, hidratado, corado, afebril, taquipneico (frequência respiratória = 64 ipm). Apresenta ronos e sibilos difusos à ausculta pulmonar. O restante do exame físico é normal. Radiografia de tórax com sinais de hiperinsuflação. Com base na hipótese diagnóstica, é correto afirmar que o provável agente envolvido é:
- Bordetella pertussis*.
  - Chlamydia trachomatis*.
  - Mycoplasma pneumoniae*.
  - Haemophilus influenzae* tipo b.
  - Vírus sincicial respiratório.
48. Menino de 8 anos é trazido para atendimento com quadro de febre alta há 5 dias, cefaleia e vômitos. Ao exame físico, está em regular estado geral, febril, desidratado de algum grau, com frequência respiratória de 28 ipm, frequência cardíaca de 120 bpm, com hiperemia conjuntival e exantema maculopapular. O sinal meníngeo é negativo. Realizada a prova do laço, apresentou 15 petéquias em antebraço.
- A conduta é:
- alta com orientações de hidratação e retorno se sinais de alarme.
  - manter em observação clínica, com hidratação oral até o resultado do hemograma.
  - expandir com soro fisiológico 20 mL/kg/hora e colher hemograma, tipagem sanguínea e albumina.
  - transfundir plasma fresco 20 mL/kg e colher hemograma, albumina, transaminases e coagulograma.
  - expandir com albumina 1 g/kg em 1 hora e colher hemograma, albumina e transaminases.
49. Criança de 10 anos portadora de anemia falciforme é trazida ao serviço de urgência com história de 2 dias de febre de 39 °C e tosse. Ao exame físico, está em regular estado geral, febril (38,5 °C), taquipneica (frequência respiratória de 30 ipm), taquicárdica (frequência cardíaca de 124 bpm), descorada 2+/4. Ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca com sopro sistólico 2+/4 panfocal, exame abdominal sem alterações. O hemograma revelou Hb = 7,5 g/dL, Ht = 29%, leucócitos = 33 500/mm<sup>3</sup> (3% bastonetes, 50% segmentados, 47% linfócitos), plaquetas = 410 000/mm<sup>3</sup> e a radiografia de tórax é normal. A conduta é:
- orientar sintomáticos e retorno em 24 horas para reavaliação.
  - colher hemocultura, introduzir antibiótico oral e orientar retorno em 48 horas.
  - colher hemocultura e manter em observação clínica por 12 horas no hospital.
  - internar, colher hemocultura e introduzir antibiótico parenteral.
  - internar, colher hemocultura, introduzir antibiótico parenteral e transfundir concentrado de hemácias.
50. Menina de 6 anos é levada ao pronto-atendimento com história de 10 dias de tosse e rinorreia e febre de 39 °C há 3 dias. Hoje, amanheceu com edema e hiperemia periorbitária à direita. Ao exame, além dos sinais flogísticos periorbitários, nota-se proptose e limitação à movimentação ocular. A opção antimicrobiana empírica deve ser
- penicilina cristalina.
  - oxacilina e ceftriaxone.
  - vancomicina e amicacina.
  - axetil cefuroxima.
  - cefalexina.

51. Criança moradora de rua é trazida pelos responsáveis de um abrigo com quadro de cefaleia, febre e mialgia, que progrediram para o aparecimento de icterícia após 1 semana. Ao exame, além da icterícia 2+/4, nota-se sufusão conjuntival. Está desidratada de algum grau. Os exames laboratoriais revelam anemia, plaquetopenia, aumento de bilirrubinas, aumento de ureia e creatinina e enzimas musculares elevadas.
- A hipótese diagnóstica é:
- (A) dengue tipo C.
  - (B) leptospirose.
  - (C) hepatite A.
  - (D) síndrome hemolítico-urêmica.
  - (E) febre amarela.
52. Em relação à Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), assinale a alternativa correta.
- (A) A observação clínica criteriosa pode ser considerada como opção terapêutica inicial para crianças com quadro agudo de PTI sem evidência de sangramentos.
  - (B) O tratamento medicamentoso é utilizado para evitar a evolução para formas crônicas da PTI.
  - (C) O tratamento medicamentoso promove um aumento rápido e duradouro do número de plaquetas circulantes.
  - (D) A Imunoglobulina específica anti-D apresenta resultados superiores aos observados com o uso da imunoglobulina convencional.
  - (E) A história natural da PTI infantil difere da forma adulta, uma vez que mais da metade das crianças evoluiu para a forma crônica da doença.
53. Menino de 3 anos, previamente hígido, é trazido com história de edema de evolução insidiosa, inicialmente acometendo a região periorbitária, evoluindo para edema de membros inferiores. O quadro foi precedido por infecção de vias aéreas superiores. Ao exame físico, nota-se edema de face, de membros inferiores e genitais, além de discreta hepatomegalia e ascite. O peso está 10% acima do peso habitual. Com base na principal hipótese diagnóstica, qual é o exame complementar que vai permitir fechar o diagnóstico?
- (A) Urina tipo I.
  - (B) Ureia e creatinina sérica.
  - (C) Proteinúria.
  - (D) Ecocardiograma.
  - (E) Ultrassonografia de abdome com *doppler* de vasos portais.
54. Menino de 2 anos, com história de diarreia mucossanguinolenta há 7 dias, evoluiu com piora, apresentando febre alta, distensão abdominal e irritabilidade. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, descorado +/4, desidratado +/4, discretamente taquipneico. Apresenta abdome distendido, doloroso difusamente, com fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito.
- A principal hipótese diagnóstica é:
- (A) invaginação intestinal.
  - (B) abscesso hepático amebiano.
  - (C) esquistossomose aguda.
  - (D) hiperinfestação por áscaris.
  - (E) estrogiloidíase.
55. Adolescente, sem atividade sexual, comparece ao atendimento médico com história de leucorreia esbranquiçada, inodora e apresentando intenso prurido vaginal. O quadro clínico é sugestivo de
- (A) leucorreia fisiológica.
  - (B) vulvovaginite por *Staphylococcus epidermidis*.
  - (C) candidíase vulvovaginal.
  - (D) vaginose bacteriana.
  - (E) infecção genital pelo herpes simples.
56. Em relação à apendicite aguda na infância, assinale a alternativa correta.
- (A) A presença de diarreia acompanhada de puxo ou tenesmo pode ocorrer nos casos de apendicite aguda devido ao processo irritativo do peritônio.
  - (B) A presença de disúria associada a alterações do sedimento urinário permite ao pediatra afastar o diagnóstico de apendicite aguda.
  - (C) A diferença de temperatura axilar-retal é patognômico dos quadros de apendicite, e a sua ausência permite afastar essa possibilidade diagnóstica.
  - (D) Nos quadros de apendicite aguda clássica, a criança costuma estar muito agitada devido às cólicas de forte intensidade.
  - (E) A presença de febre alta e de alterações no leucograma indicam a necessidade de, no mínimo, 12 horas de antibioticoterapia previamente ao procedimento cirúrgico, para “esfriar o processo infeccioso”.

- 57.** Criança de 3 anos com queixa de dor em coxa esquerda, de início abrupto, incapacitante, acompanhada de febre baixa. Ao exame, presença de limitação à rotação interna de coxa. O hemograma apresenta leucocitose discreta e a dosagem da proteína C reativa e da velocidade de hemossedimentação (VHS) estão discretamente elevadas. Realizado ultrassom de quadril que revelou edema e discreto espessamento sinovial.
- A conduta, nesse caso, é
- (A) puncionar a articulação.
  - (B) introduzir oxacilina e drenar a articulação.
  - (C) introduzir oxacilina e manter em observação clínica.
  - (D) coletar perfil reumatológico e introduzir corticoterapia oral.
  - (E) orientar repouso e prescrever analgésico comum.
- 58.** Criança de 2 anos, previamente hígida, com quadro febril, apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada com duração de 5 minutos. Deu entrada no serviço de emergência em estado pós-ictal, com exame físico normal, exceto pela presença de otite média aguda. Além do tratamento da otite, a conduta deve ser
- (A) coletar líquido.
  - (B) realizar tomografia computadorizada de crânio.
  - (C) solicitar eletroencefalograma na urgência.
  - (D) dar alta com fenobarbital e encaminhamento para realizar eletroencefalograma na rotina.
  - (E) dar alta com orientações quanto à conduta na vigência de episódios febris.
- 59.** A principal causa de insuficiência cardíaca na infância é
- (A) febre reumática.
  - (B) miocardite viral aguda.
  - (C) cardiopatia congênita.
  - (D) glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica.
  - (E) síndrome de Kawasaki.
- 60.** Criança de 3 anos é trazida para atendimento com quadro agudo de desconforto pré-cordial e tontura. Ao exame físico, constata-se frequência cardíaca é de 200 bpm e não há sinais de instabilidade hemodinâmica. O eletrocardiograma confirma a taquicardia, com presença de complexo QRS estreito. A conduta inicial é
- (A) realizar manobra vagal.
  - (B) realizar cardioversão elétrica sincronizada.
  - (C) prescrever adenosina intravenosa.
  - (D) prescrever amiodarona intravenosa.
  - (E) prescrever lidocaína intravenosa.





