



## **PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ**

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

### **046. PROVA OBJETIVA**

#### **Médico Otorrinolaringologista**

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

**01.** Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

**02.** O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

**03.** Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

**04.** Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
- A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...

- (A) sem tamanho / normais
- (B) enormes / excepcionais
- (C) imprudentes / perfeitas
- (D) despropositadas / estandardizadas
- (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

**05.** Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

**06.** A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

**07.** Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

**08.** Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

**09.** Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. *Folha de S. Paulo*, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

## POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:
- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
  - (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
  - (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
  - (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
  - (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.
12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com
- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
  - (B) dislipidemia.
  - (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
  - (D) pais hipertensos.
  - (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.
13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.
- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
  - (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
  - (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
  - (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
  - (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
  - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
  - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
  - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
  - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
  - (B) Silicose.
  - (C) Tuberculose.
  - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
  - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
  - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
  - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
  - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
  - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
  - (B) deve ser administrada ao nascer.
  - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
  - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
  - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
  - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
  - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
  - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
  - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
  - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
  - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
  - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
  - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
  - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
  - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
  - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

## ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
- (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
- (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
- (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
- (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
  - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
  - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
  - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
  - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
- (B) na Venezuela.
- (C) na Colômbia.
- (D) na Bolívia.
- (E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão \_\_\_\_\_, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Ao realizar o teste de Weber em paciente com perda sensorineural unilateral à direita, o som do diapásão
- (A) será escutado por via óssea após não ser mais escutado por via aérea na orelha esquerda.
  - (B) não será escutado na orelha contralateral à perda auditiva.
  - (C) lateralizará para a orelha contralateral à perda auditiva.
  - (D) lateralizará igualmente para as duas orelhas.
  - (E) lateralizará para a orelha ipsilateral à perda auditiva.
32. Assinale a alternativa que contém a sequência correta das estruturas do trato auditivo, de periférico para central.
- (A) Cóclea – nervo coclear – complexo olivar superior – lemnisco lateral – colículo inferior – corpo geniculado medial – núcleos cocleares – córtex auditivo.
  - (B) Cóclea – nervo coclear – núcleos cocleares – complexo olivar superior – lemnisco lateral – colículo inferior – corpo geniculado medial – córtex auditivo.
  - (C) Cóclea – nervo coclear – núcleos cocleares – corpo geniculado medial – complexo olivar superior – lemnisco lateral – colículo inferior – córtex auditivo.
  - (D) Cóclea – colículo inferior – corpo geniculado medial – nervo coclear – núcleos cocleares – complexo olivar superior – lemnisco lateral – córtex auditivo.
  - (E) Cóclea – nervo coclear – núcleos cocleares – complexo olivar inferior – lemnisco medial – colículo inferior – corpo geniculado lateral – córtex auditivo.
33. Em um paciente com perda auditiva condutiva, o que encontraremos no resultado do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral (PEATE)?
- (A) Presença somente das ondas I, II e III e aumento do intervalo entre elas.
  - (B) Ausência de ondas I, III e V e latência normal das demais ondas.
  - (C) Aumento do intervalo entre as ondas I e II e entre as ondas III e V.
  - (D) Aumento absoluto da latência de todas as ondas, sem alteração do intervalo entre elas.
  - (E) PEATE sem alterações.
34. Na classificação de Bébéar para schwannomas vestibulares, um tumor que tem projeção no ângulo ponto-cerebelar e não toca no tronco cerebral deve ser classificado como estágio
- (A) I.
  - (B) II.
  - (C) III.
  - (D) IV.
  - (E) V.
35. Paciente do sexo masculino, 48 anos, apresenta episódio de paralisia facial à esquerda há 10 dias. Apresentou pró-dromos de alteração do paladar, lacrimejamento e otalgia ipsilateral dois dias antes do início da paralisia. Hoje não consegue fechar o olho esquerdo com esforço máximo e apresenta assimetria facial em repouso. Apresenta teste de Schirmer alterado à esquerda com redução importante do lacrimejamento. Otoscopia e oroscopia normais. Apresenta hiperacusia com audiometria normal e reflexo estapediano abolido. Realizou eletroneurografia que mostrou 60% de degeneração das fibras nervosas. O diagnóstico mais provável, o exame essencial para o diagnóstico diferencial, o grau aproximado da paralisia facial pela classificação de House-Brackmann e o tratamento mais indicado são, respectivamente:
- (A) paralisia de Bell, ressonância magnética (RM) de ossos temporais, grau V e corticosteroide.
  - (B) paralisia de Bell, RM de ossos temporais, grau V e descompressão cirúrgica do nervo facial.
  - (C) paralisia de Bell, tomografia computadorizada (TC) de ossos temporais, grau V e corticosteroide.
  - (D) síndrome de Ramsay-Hunt, TC de ossos temporais, grau V e antiviral.
  - (E) paralisia de Bell, RM de ossos temporais, grau IV e corticosteroide.
36. Em relação ao torcicolo paroxístico da infância, é correto afirmar:
- (A) acomete crianças acima de 2 anos.
  - (B) é uma vertigem de origem central.
  - (C) há tendência de resolução espontânea até os 5 anos.
  - (D) é precursor da doença de Ménière.
  - (E) melhora com a utilização de cinarizina.

37. Paciente de 50 anos, masculino, procurou atendimento médico com história de vertigem incapacitante, náuseas e vômitos há 6 horas. Nega queixa auditiva associada. Apresenta dificuldades para deambular, com quedas para o lado direito. Tem antecedente de hipertensão arterial controlada com hidroclorotiazida. Refere quadro de infecção recente de vias respiratórias. Nega quadros de tontura anterior. No exame físico, presença de nistagmo espontâneo horizontal com componente rápida para a esquerda. Diante desse quadro, a principal hipótese diagnóstica e a melhor conduta são, respectivamente:
- (A) migrânea vestibular; tomografia computadorizada (TC) de crânio e encaminhamento para a neurologia.
  - (B) acidente vascular de tronco encefálico; TC de crânio e encaminhamento para a neurologia.
  - (C) insuficiência vértebro-basilar; pentoxifilina e acompanhamento ambulatorial.
  - (D) neurite vestibular; betaistina e acompanhamento ambulatorial.
  - (E) neurite vestibular; sedativo labiríntico e internação.
38. Lactente apresenta, desde o nascimento, estridor inspiratório, associado à retração de fúrcula esternal e tiragem intercostal aos esforços. Mãe nega dispneia em repouso, cianose ou disfagia. Tem ganho pômbero-estatural adequado. O exame para investigação, a principal hipótese diagnóstica e a melhor conduta são, respectivamente:
- (A) nasofibrolaringoscopia, laringomalácia e acompanhamento clínico.
  - (B) TC cervical, estenose subglótica e cirurgia.
  - (C) tomografia computadorizada (TC) cervical, paralisia de pregas vocais e aritenoidectomia.
  - (D) TC cervical, laringomalácia e supraglotoplastia.
  - (E) nasofibrolaringoscopia, laringomalácia e suplementação de cálcio.
39. A contração do músculo tireoaritenóideo durante a fonação deixa as pregas vocais (em relação à posição de repouso)
- (A) mais finas e na mesma altura.
  - (B) mais longas e mais altas.
  - (C) mais espessas e mais baixas.
  - (D) inalteradas em relação à espessura e altura.
  - (E) mais longas e mais baixas.
40. Paciente com carcinoma glótico restrito à prega vocal e fixação da prega vocal acometida provavelmente tem invasão do(a)
- (A) nervo laríngeo inferior.
  - (B) músculo tireoaritenóideo.
  - (C) músculo cricótireóideo.
  - (D) cartilagem cricóidea.
  - (E) nervo laríngeo superior.
41. O colágeno intracordal exerce importante função na histologia e fisiologia da fonação. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o tipo de colágeno e sua respectiva localização na prega vocal.
- (A) Colágeno tipo IV – ligamento vocal.
  - (B) Colágeno tipo III – camada superficial da lâmina própria.
  - (C) Colágeno tipo V – epitélio da prega vocal.
  - (D) Colágeno tipo III – ligamento vocal.
  - (E) Colágeno tipo III – zona da membrana basal.
42. Paciente com 45 anos apresenta um nódulo indolor, de consistência firme, em parótida esquerda, há 3 meses. Não há outras queixas ou sinais de paresia ou paralisia do nervo facial. A principal hipótese diagnóstica é:
- (A) adenoma pleomórfico.
  - (B) linfonodo intraparotídeo.
  - (C) tumor de Warthin.
  - (D) carcinoma mucoepidermoide.
  - (E) sialolitíase.
43. Paciente transexual que acaba de realizar cirurgia para mudança de sexo, do gênero masculino para o feminino, é encaminhado ao ambulatório de otorrinolaringologia pois deseja uma voz mais feminina. Segundo Ishiki, a melhor técnica a ser utilizada nesse caso é a tireoplastia do tipo
- (A) I.
  - (B) II.
  - (C) III.
  - (D) IV.
  - (E) V.

44. Com relação às lesões pré-malignas da laringe, é correto afirmar:
- (A) são representadas clinicamente pela leucoplasia, eritroplasia e eritroqueratose, sendo as eritroplasias as lesões de melhor prognóstico.
  - (B) as leucoplasias podem ser única ou múltiplas, acometer uma ou ambas as pregas vocais, sendo mais comum o surgimento das lesões em supraglote.
  - (C) a persistência de leucoplasia plana, lisa, nítida e tênue, mesmo após um tratamento clínico por cerca de 1 mês, dispensa o estudo histológico.
  - (D) o tratamento clínico das leucoplasias envolve cessação de tabagismo, controle do refluxo laringofaríngeo, corticosteroide tópico e vitamina A.
  - (E) as eritroplasias são mais comuns na subglote.
45. A Classificação de Friedman, utilizada na avaliação de pacientes com ronco e apneia, tem como parâmetros:
- (A) volume da língua e das tonsilas palatinas.
  - (B) tamanho das tonsilas palatinas e índice de Mallampati modificado.
  - (C) tamanho das tonsilas palatinas e grau de desvio septal.
  - (D) volume da língua e índice de Mallampati modificado.
  - (E) tamanho das tonsilas linguais e índice de Mallampati modificado.
46. Recém-nascido, 15 dias de vida, vem ao consultório otorrinolaringológico para avaliação de lesão arredondada em dorso nasal (glabella) desde o nascimento. Quanto aos diagnósticos diferenciais possíveis, é correto afirmar:
- (A) a meningocele é a lesão mais comum nessa região.
  - (B) os gliomas intranasais são os mais comuns.
  - (C) o cisto dermoide é a lesão menos comum da linha média.
  - (D) os gliomas apresentam-se clinicamente como lesões pulsáteis.
  - (E) a meningoencefalocele nasal mais comum é a frontoetmoidal.
47. Em relação à rinite gonocócica do lactente, é correto afirmar:
- (A) o início dos sintomas ocorre antes de 15 dias de vida e pode levar a sinéquias e estenoses nasais.
  - (B) as primeiras manifestações tornam-se aparentes entre duas e dez semanas após o nascimento e cursam com rinorreia esbranquiçada persistente, ora com laivos de sangue.
  - (C) o tratamento de escolha para os casos não complicados é feito com ceftriaxona, por 7 dias.
  - (D) o início dos sintomas ocorre após os 3 meses de vida e cursa com rinorreia purulenta persistente, sem laivos de sangue, sendo o tratamento de escolha realizado com doxiciclina.
  - (E) está associada a sangramento uretral intermitente.
48. Paciente de 7 anos de idade foi trazido ao consultório do otorrinolaringologista por apresentar obstrução nasal crônica. Ao exame de nasofibrosopia, apresentava abaulamento da parede medial dos seios maxilares e presença de pequenos pólipos em meatos médios. Qual a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso?
- (A) Bola fúngica.
  - (B) Polipose nasossinusal.
  - (C) Mucoviscidose.
  - (D) Síndrome de Woakes.
  - (E) Rinite alérgica.
49. Criança de 2 anos de idade foi trazida por seus pais ao consultório médico, pois iniciou quadro de febre alta (40 °C), mal-estar, coriza, mialgia, dor de garganta e disfagia. Ao exame, apresentava pequenas úlceras em palato mole e orofaringe, sem lesões em gengivas.
- A principal hipótese diagnóstica é:
- (A) gengivoestomatite herpética.
  - (B) escarlatina.
  - (C) sífilis secundária.
  - (D) afta *minor*.
  - (E) herpangina.

50. Criança de 7 anos de idade foi trazida ao consultório devido à mãe ter notado presença de abaulamento em região cervical anterior. Ao exame da cavidade oral, você percebeu que a lesão elevou-se quando a criança exteriorizou a língua. A principal hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica mais indicada são, respectivamente:
- (A) cisto do ducto tireoglosso; punção e aspiração do cisto.  
 (B) cisto de segundo arco branquial; punção e aspiração do cisto.  
 (C) cisto do ducto tireoglosso; cirurgia de Sistrunk.  
 (D) cisto dermoide; punção e aspiração do cisto.  
 (E) cisto dermoide; cirurgia de Sistrunk.
51. A presença de fenda subepitelial no exame imuno-histológico da mucosa oral de paciente com lesões vesico-bolhosas recorrentes é sugestiva de
- (A) pênfigo vulgar.  
 (B) penfigoide bolhoso.  
 (C) necrólise epidérmica tóxica.  
 (D) afta.  
 (E) líquen plano.
52. Paciente do gênero masculino, 26 anos, com história de aftas recorrentes, uveíte e artralgia. Procurou diversos serviços e não obteve melhora com uso de sintomáticos. Começou a ter lesões genitais recorrentes, que foram inicialmente diagnosticadas como herpes simples. O diagnóstico mais provável é:
- (A) doença de Behçet.  
 (B) afta por neutropenia cíclica.  
 (C) herpangina.  
 (D) herpes simples tipo 1 e 2.  
 (E) pênfigo vulgar.
53. Paciente de 14 anos chega ao PS com história de obstrução nasal e rinorreia amarelada à esquerda há 5 dias. Refere que, há 1 dia, iniciou quadro de proptose e hiperemia palpebral ípsilaterais ao quadro nasal. Realizada tomografia computadorizada de seios paranasais que evidenciou a presença de abscesso subperiosteal em órbita esquerda. Frente a esse quadro, assinale a alternativa que contém a classificação correta da afecção, segundo os critérios de Chandler e de Mortimore, respectivamente.
- (A) Chandler 2; Mortimore III.  
 (B) Chandler 3; Mortimore III.  
 (C) Chandler 4; Mortimore II.  
 (D) Chandler 2; Mortimore II.  
 (E) Chandler 3; Mortimore II.
54. São critérios diagnósticos da rinosinusite fúngica alérgica:
- (A) presença de mucina alérgica e IgE sérica total elevada.  
 (B) IgE específico positivo para fungos e cacosmia.  
 (C) presença de cristais de Charcot-Leyden e de mucina alérgica.  
 (D) presença de invasão óssea e polipose nasal.  
 (E) presença de cristais de Charcot-Leyden e IgE sérica total diminuída.
55. Quanto aos métodos diagnósticos na rinite alérgica, assinale a alternativa correta.
- (A) A presença de teste cutâneo de hipersensibilidade positivo para ácaro confirma a rinite alérgica por esse agente.  
 (B) Os testes cutâneos de hipersensibilidade não devem ser solicitados rotineiramente no diagnóstico de pacientes com rinite alérgica.  
 (C) Aumento de IgE sérica total tem alto valor diagnóstico para rinite alérgica.  
 (D) O valor preditivo positivo do RAST é semelhante ao do teste cutâneo de hipersensibilidade.  
 (E) O citológico nasal com eosinofilia determina a presença de rinite alérgica.
56. Paciente com quadro de obstrução nasal, rinorreia aquosa e espirros, desencadeados pela inalação de produtos químicos, gases, partículas de óleo diesel, ar muito frio e seco ou exposição excessiva à luz, apresenta diagnóstico mais provável de rinite
- (A) eosinofílica não alérgica.  
 (B) por irritantes.  
 (C) alérgica.  
 (D) atrófica primária.  
 (E) induzida por drogas.
57. Segundo o *ARIA – Allergic Rhinitis And Its Impact On Asthma*, as rinites alérgicas são classificadas de acordo com
- (A) o tipo e a duração dos sintomas.  
 (B) o tipo dos sintomas e a interferência na qualidade de vida dos pacientes.  
 (C) a intensidade dos sintomas, apenas.  
 (D) a duração dos sintomas, apenas.  
 (E) a duração dos sintomas e a interferência na qualidade de vida dos pacientes.

- 58.** A polipose nasossinusal apresenta diversas variações nas características de seus mediadores e padrões inflamatórios. Assinale a alternativa correta.
- (A) Há pequena produção de citocinas pró-inflamatórias na polipose nasossinusal.
  - (B) O neutrófilo é o tipo celular mais comumente associado à polipose nasossinusal, porém diversas outras células também podem participar de sua fisiopatologia, como os linfócitos.
  - (C) O padrão inflamatório da polipose nasossinusal costuma se diferenciar consideravelmente do padrão inflamatório da rinosinusite crônica sem pólipos, sendo estas duas doenças consideradas entidades diferentes atualmente.
  - (D) Pacientes comprovadamente alérgicos têm maior probabilidade de desenvolverem polipose nasossinusal.
  - (E) O padrão de respostas Th1/Th2/Th17 é constante nas poliposes nasossinusais, independentemente da população estudada (europeia, asiática ou americana).
- 59.** São medicamentos/drogas que podem causar disfunção do olfato:
- (A) álcool, cloridrato de amiodarona e nafazolina.
  - (B) enalapril, nimesulida e oximetazolina.
  - (C) sinvastatina, diclofenaco potássico e álcool.
  - (D) codeína, enalapril e levofloxacina.
  - (E) amoxicilina, amicacina e nimesulida.
- 60.** Paciente do sexo masculino, 38 anos, com dor hemicraniana à esquerda, de início súbito, de forte intensidade e inquietante, acompanhada de obstrução nasal, rinorreia, lacrimejamento e hiperemia conjuntival ipsilateral à dor. O diagnóstico clínico mais provável para esse paciente é de
- (A) enxaqueca.
  - (B) cefaleia em salva.
  - (C) cefaleia rinogênica.
  - (D) cefaleia tensional.
  - (E) tumor cerebral.





