

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO PSIQUIATRA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/01/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, de 10/11/2014.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2015

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – MÉDICO PSQUIATRA

01 - Paciente, 20 anos, masculino, com história de síndrome psicótica. Durante o seu atendimento psiquiátrico vê que seu médico jogou no lixo a caneta que estava usando e pegou uma nova caneta na bolsa, o paciente entende esse ato como um sinal de que o médico quer matá-lo. Tal situação caracteriza-se por:

- A) Alucinação visual
- B) Ilusão visual
- C) Hipotímia
- D) Distraibilidade
- E) Percepção delirante

02 - Qual das escalas ou questionários abaixo serve para detectar alcoolistas crônicos?

- A) FARGERSTRON
- B) HAMILTON
- C) PANSS
- D) CAGE
- E) BRUNEL

03 - Ana Emília, 35 anos, chega a um pronto socorro e refere estar sentindo uma “dor no peito” há 10 minutos, além de sensação de “falta de ar” e de morte iminente. Depois de avaliada clinicamente, foram descartadas as possibilidades de causas médicas gerais. Já havia apresentado outras vezes o mesmo quadro clínico sendo imprevisível seu aparecimento. Questionada sobre sintomas de humor, relatou que chorou há alguns dias devido à discussão no trabalho. Foi medicada e liberada após alívio dos sintomas, com orientação de procurar um psiquiatra para seguimento do tratamento. A descrição acima sugere ser um caso de:

- A) Transtorno do Pânico
- B) Ansiedade generalizada
- C) Transtorno misto ansioso e depressivo
- D) Histeria de angústia
- E) Fobia social

04 - Na Síndrome de Abstinência Alcoólica, uma boa conduta terapêutica seria:

- A) Administração de clorpromazina para tratamento de agitação psicomotora.
- B) Prescrição de benzodiazepínicos baseada nos sintomas.
- C) Administração de fenil-hidantoína, se convulsão.
- D) Realização de contenção mecânica preventiva para evitar heteroagressividade.
- E) Prescrição de hidratação com soro glicosado imediatamente, pelo risco de hipoglicemia.

05 - Sobre o tratamento farmacológico da Síndrome de Dependência de Nicotina (SDN) assinale a alternativa correta:

- A) Os adesivos de nicotina devem ser utilizados de maneira padrão, iniciando com 21mg e reduzindo de forma progressiva para 14mg e depois 7mg a cada semana.
- B) Não há contraindicação para o tratamento farmacológico com nicotina, uma vez que o indivíduo na SDN já está exposto a essa substância pelo próprio cigarro.

C) O uso da Vareniclina (Champix®) está reservado para casos graves e não responsivos a outros tratamentos.

D) A bupropiona é um dos principais fármacos utilizados no tratamento da SDN, sendo a história de crises convulsivas uma das suas principais contraindicações.

E) A neurobiologia demonstrou que a SDN se justifica por fatores intrinsecamente psicológicos.

06 - Paciente internado em hospital psiquiátrico insiste em afirmar que seu médico é um amigo da rua onde mora, identificando assim falsamente o médico como se fosse alguém de seu círculo pessoal. Tal situação trata-se de:

- A) Síndrome de Frégoli
- B) Síndrome de Capgras
- C) Síndrome do duplo subjetivo
- D) Síndrome de internetamorfose
- E) Fenômeno do já visto (déjà-vu)

07 - Alguns antidepressivos provocam sintomas de retirada quando o fármaco é descontinuado subitamente. Dentre os antidepressivos abaixo qual teria menor probabilidade de causar síndrome de descontinuação:

- A) Duloxetina
- B) Venlafaxina
- C) Sertralina
- D) Paroxetina
- E) Fluoxetina

08 - Em relação ao uso de drogas ilícitas assinale a alternativa correta:

- A) A síndrome de abstinência da maconha inicia já nas primeiras 24 horas após a cessação do uso, com sintomas subjetivos de ansiedade e de irritabilidade, alterações do sono e desconforto físico.
- B) O tratamento para Síndrome de Dependência de Cocaína/Crack deve ser feito em ambiente hospitalar por período prolongado, pelo menos 30 dias, devido às diversas complicações clínicas associadas.
- C) Durante a intoxicação por cocaína ou crack não é possível fazer o uso de nenhum antipsicótico devido ao risco de complicações cardíacas por interações farmacológicas.
- D) O uso de antidepressivos é essencial para manutenção do tratamento da dependência de maconha e cocaína.
- E) Ainda não há evidências científicas que correlacione o uso de maconha com transtornos psiquiátricos.

09 - Em relação aos transtornos alimentares assinale a alternativa correta:

- A) O transtorno da compulsão alimentar periódica está associada com o uso regular de comportamentos compensatórios inadequados.
- B) A síndrome alimentar noturna é caracterizada por episódios de hiperfagia entre o horário do jantar e início do sono e/ou episódios de ingestão alimentar durante o despertar noturnos ocorrendo por vezes esquecimento dos eventos.

- C) Na anorexia nervosa há distorção na imagem corporal com medo de engordar ou de ter o corpo disforme pela gordura corporal, embora seu peso esteja normal ou discretamente elevado.
- D) No tratamento da anorexia nervosa, durante a fase de realimentação, é necessário o monitoramento clínico para combater a síndrome de realimentação, que é caracterizada por hipofosfatemia, rápida diminuição do potássio e magnésio, intolerância a glicose, disfunção gastrointestinal e arritmias cardíacas.
- E) Devido ao efeito anorexígeno da fluoxetina deve-se evitar o seu uso no tratamento de bulimia nervosa e anorexia nervosa.

10 - RRS, 65 anos, sexo masculino, casado, 14 anos de escolaridade, foi levado pela família para um atendimento psiquiátrico, pois há um ano iniciou quadro de parkinsonismo e recentemente passou a apresentar flutuação cognitiva, com alucinações visuais e ocorrência de perda transitória da consciência. Tal descrição sugere quadro de:

- A) Demência vascular
- B) Demência de Alzheimer
- C) Demência com corpos de Lewy
- D) Demência frontotemporal
- E) Demência subcortical

11 - APS, 45 anos, sexo feminino, passou a apresentar dores abdominais e sintomas dispépticos. Foi internada em hospital geral para investigação diagnóstica de possível quadro de neoplasia intestinal. Seu médico assistente cogitou a associação de algum transtorno psiquiátrico e solicitou uma avaliação do serviço de interconsulta. Ao avaliá-la o psiquiatra evidenciou quadro de sofrimento e perturbação emocional subjetivos, tristeza e apreensão quanto ao futuro. Tal quadro sugere:

- A) Transtorno de adaptação
- B) Episódio depressivo
- C) Transtorno misto ansioso e depressivo
- D) Transtorno hipocondríaco
- E) Transtorno de somatização

12 - Em relação ao transtorno bipolar (TB) assinale a alternativa correta:

- A) A lamotrigina demonstrou alta eficácia no tratamento para depressão bipolar, sendo primeira escolha terapêutica.
- B) A carbamazepina tem eficácia antimaniaca, sobretudo em manias disfóricas e ciclagem rápida, sua eficácia antidepressiva não é expressiva, porém a eficácia profilática é significativa.
- C) A indução de hipotireoidismo pelo tratamento com lítio é indicação para sua suspensão terapêutica.
- D) A bupropiona deve ser evitada no tratamento do TB, havendo evidências de que pode induzir episódios maníacos e hipomaníacos e acelerar a ciclagem, devendo-se dar preferência ao uso de venlafaxina.
- E) O uso de antipsicóticos de segunda geração apresentou eficácia tanto para episódios maníacos quanto para depressão aguda, mas não são recomendados como primeira linha na farmacoterapia de manutenção.

13 - Em relação à Síndrome de dependência de álcool (SDA) assinale a alternativa correta:

- A) A dose habitual do dissulfiram é de 250mg por dia, podendo ser pilado e colocado na refeição do paciente mesmo sem o seu conhecimento, de modo que o efeito antiabuse reconduza o paciente a aceitar o tratamento da SDA.
- B) Algumas alterações clínicas decorrentes do uso de álcool como o aumento de GGT (gamaglutamil transferase), diminuição do VCM (volume corpuscular médio) e da transferrina no sangue são esperadas e indicam consumo abusivo e crônico.
- C) A síndrome de Wernicke-Korsakoff consiste em um quadro caracterizado por alucinações, tremores, febre e hiper-responsividade autonômica, como hipertensão, taquicardia e sudorese.
- D) A naltrexona é um antagonista do receptor opioide que atua como atenuante dos efeitos prazerosos do álcool. Sua principal contraindicação são doenças hepáticas agudas e crônicas.
- E) O tratamento deve instituir medicamentos antidepressivos que aliviem os sintomas depressores do SNC advindos da retirada do álcool.

14 - Em relação ao transtorno bipolar (TB) na gestação, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A carbamazepina é o estabilizador de humor que apresenta o maior risco para malformação, sintomas perinatais e sequelas neurocomportamentais e seu uso no primeiro semestre pode levar a malformação de 6 a 24%.
- B) Dado o alto risco de recaída com a retirada do medicamento, a orientação clínica é que a maioria das pacientes com diagnóstico de TB mantenha a medicação durante a gestação.
- C) As drogas mais seguras para o tratamento do transtorno bipolar são lítio, lamotrigina e antipsicóticos de primeira geração.
- D) A incidência de malformações cardíacas (anomalia de Ebstein) em fetos expostos ao lítio é de 0,1 a 0,2%.
- E) Até o momento, não há evidência de associação de antidepressivos tricíclicos com malformação.

15 - Sobre a esquizofrenia, julgue as alternativas abaixo:

- I) Existem várias dimensões psicopatológicas como: psicótica, deficitária (ou negativa), depressiva e de desorganização do pensamento e da conduta.
- II) Na esquizofrenia hebefrênica, ocorre predomínio de sintomas de desorganização do pensamento e do comportamento.
- III) Porfiria aguda intermitente, doença de Wilson, epilepsia de lobo temporal, infecção por HIV são doenças associadas ao desenvolvimento de sintomas psicóticos.
- IV) Antibióticos, antivirais, ansiolíticos, antidepressivos e corticosteróides são medicações associadas à produção de sintomas psicóticos.

- A) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- B) Estão corretas somente as alternativas I, II e IV.
- C) Estão corretas somente as alternativas I, II e III.
- D) Somente a alternativa II está correta.
- E) Todas estão corretas.

16 - A respeito da esquizofrenia, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) Na esquizofrenia, os sintomas negativos são detectados, muitas vezes, desde o início, ao passo que os sintomas psicóticos ocorrem durante os episódios de exacerbação.
- B) Os antipsicóticos não estão associados à redução da progressão da esquizofrenia; seu uso se restringe ao controle dos sintomas da doença.
- C) O alargamento do sistema ventricular é um achado neuroestrutural presente tanto em pacientes com esquizofrenia quanto em pacientes com transtornos de humor, embora nestes ocorra em menor grau.
- D) Existe correlação entre a redução da atividade pré-frontal cerebral em pacientes com esquizofrenia e as funções cognitivas.
- E) Muitas vezes a criança portadora de transtorno afetivo bipolar (TAB), recebe o diagnóstico de esquizofrenia em razão da presença de delírios persecutórios e alucinações, porém durante a evolução do quadro, observa-se a presença de ressonância afetiva, busca de contato com outras pessoas, oscilações do humor e retorno ao padrão anterior de funcionamento acadêmico e social.

17 - Em relação ao tratamento da esquizofrenia é correto afirmar que:

- A) Observa-se resposta aos antipsicóticos já na primeira semana de tratamento.
- B) Preconiza-se o uso de antipsicóticos por 2 a 4 semanas para se avaliar a resposta do tratamento.
- C) A terapia cognitiva comportamental (TCC) promove melhora dos sintomas gerais da esquizofrenia, inclusive em pacientes refratários à clozapina.
- D) É considerado refratário o paciente que recebeu tratamento com pelo menos um antipsicótico em doses e período adequados e que não obtiveram remissão completa do quadro.
- E) As medicações antipsicóticas típicas são menos eficazes que as atípicas no controle dos sintomas positivos.

18 - As características sugestivas de bipolaridade na depressão são todas abaixo, **EXCETO**:

- A) Idade de início precoce
- B) Depressão com sintomas atípicos
- C) Depressão psicótica
- D) Resposta aguda e profilática ao antidepressivo
- E) Temperamento hipertímico

19 - ABC é um paciente de 73 anos que iniciou quadro de desânimo, humor deprimido, fadiga e insônia há mais de 6 meses, pouco tempo após o falecimento de sua esposa. Refere ser hipertenso e apresentar doença coronariana, estando em uso de Losartana, AAS e Sinvastatina. Foi-lhe prescrito Sertralina na dose de 25 mg. Após 2 semanas, o mesmo retornou ao psiquiatra, relatando melhora do sono, porém ainda mantém demais sintomas. Qual a melhor conduta a ser tomada?

- A) Trocar o antidepressivo em uso por um tricíclico.
- B) Suspender a medicação e iniciar psicoterapia.
- C) Suspender medicação em uso e iniciar triiodotironina.
- D) Potencializar com benzodiazepínico de ação curta.
- E) Aumento da dose da medicação antidepressiva.

20 - Paciente de 26 anos vem apresentando episódios de sudorese, palpitações, sensação de falta de ar, tremores há cerca de 2 semanas (teve 3 “crises”). Qual a assertiva correta?

- A) Solicitar exames laboratoriais para excluir algumas patologias orgânicas e questionar uso de drogas de abuso e de medicações.
- B) Trata-se de um transtorno ansioso e deve-se iniciar imediatamente o tratamento com ISRS.
- C) Deve-se iniciar o tratamento com benzodiazepínicos, embora estes possam aumentar os sintomas ansiosos nos primeiros dias de uso.
- D) Os tricíclicos e a bupiriona são o tratamento de primeira linha.
- E) O tratamento medicamentoso deve ser mantido por apenas 6 meses, pois o risco de recaídas é baixo.

21 - É considerado fármaco de 1ª linha no tratamento da fobia social:

- A) Tranilcipromina
- B) Propranolol
- C) Venlafaxina
- D) Gabapentina
- E) Pregabalina

22 - Paciente relata ter sido ameaçada de morte durante assalto há 3 dias e desde então vem apresentando sensação de opressão precordial, insônia, pesadelos, lembranças repetitivas do assalto e medo de sair de casa. Diante do quadro, qual a melhor conduta a ser adotada?

- A) Iniciar benzodiazepínicos
- B) Iniciar beta-bloqueador e ISRS
- C) Iniciar bupiriona
- D) Iniciar terapia psicanalítica
- E) Iniciar IMAO

23 - Em relação ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC), marque a alternativa correta:

- A) A presença de outros transtornos psiquiátricos é pouco comum no TOC.
- B) O tratamento psicológico de primeira escolha para o TOC é a terapia psicodinâmica.
- C) O tratamento medicamentoso de primeira linha consiste no uso de inibidores da monoamina oxidase (IMAO).
- D) A ocorrência de sintomas obsessivos compulsivos subclínicos na infância não aumenta a chance de o indivíduo apresentar TOC na idade adulta.
- E) Alguns estudos demonstram maior frequência de sintomas obsessivos compulsivos (SOC), TOC e tiques em portadores de febre reumática.

24 - Em relação aos transtornos psiquiátricos na infância, assinale a alternativa correta:

- A) O transtorno de ansiedade de separação está entre os quadros psiquiátricos mais comuns na infância e na adolescência.
- B) Depressão e abuso de substâncias dificilmente ocorrem ao longo do curso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
- C) O metilfenidato é sempre a medicação de primeira escolha no tratamento dos transtornos de conduta.
- D) Os transtornos invasivos do desenvolvimento são: autismo infantil, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Clérambald, síndrome de Capgras e transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra especificação.
- E) As medicações padrão que tratam os sintomas nucleares do autismo são: risperidona e aripiprazol.

25 - O transtorno de somatização:

- A) É caracterizada por preocupação e temor de ter ou a ideia de padecer de uma doença séria, baseada na interpretação pessoal de sintomas corporais.
- B) É mais comum no sexo masculino.
- C) Tem duração de pelo menos 1 mês.
- D) É também denominado Síndrome de Briquet.
- E) Tem início após os 30 anos de idade.

26 - Sobre as convulsões dissociativas, é **INCORRETO** afirmar:

- A) São acompanhadas de mordedura de língua, contusão séria ou incontinência urinária.
- B) São caracterizadas por movimentos espasmódicos súbitos e inesperados.
- C) Fazem diagnóstico diferencial com condições de origem neurológica.
- D) Seus sintomas não podem ser explicados por nenhum distúrbio físico.
- E) Há associação temporal entre o seu início e eventos estressantes, problemas ou necessidades.

27 - A respeito da psicofarmacoterapia no idoso, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) No tratamento dos transtornos psiquiátricos em idosos, os medicamentos devem ser introduzidos em doses menores e os ajustes de dose devem ser feitos lentamente.
- B) Os indivíduos idosos são mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos com ação anticolinérgica e antidopaminérgica.
- C) Os inibidores de recaptção de serotonina são, em geral, drogas seguras para o manejo da depressão em idosos, no entanto os diferentes medicamentos dessa classe têm propriedades farmacocinéticas distintas.
- D) No tratamento da depressão no idoso, as doses dos antidepressivos devem ser sempre mantidas na faixa subterapêutica, para evitar a ocorrência de interações com outros fármacos.
- E) Os benzodiazepínicos devem, sempre que possível, ser evitados em pacientes geriátricos.

28 - Paciente de 65 anos refere apresentar há cerca de 30 anos quadro de preocupação excessiva em relação a diversos eventos de sua vida, a qual conseguia controlar com terapia. Há cerca de um ano começou a apresentar irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Nesse período foi consultada por clínico que lhe prescreveu Clonazepam na dose de 2 mg, o qual vem fazendo uso até hoje. Em relação ao caso, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Os antidepressivos inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS) seriam os medicamentos de primeira escolha nesse caso.
- B) A terapia combinada (medicamentosa e psicoterápica), independentemente da idade do paciente, é indicada para casos como o da paciente acima.
- C) Benzodiazepínicos podem ser usados nas fases iniciais do tratamento, em doses baixas, com especial atenção aos efeitos sedativos.
- D) Técnicas cognitivas específicas, focalizadas em aspectos práticos da vida do paciente, podem ser úteis no tratamento da ansiedade nessa faixa etária.
- E) Deve-se evitar o uso de qualquer medicação devido aos riscos de complicações clínicas nessa faixa etária da paciente, portanto a conduta inicial seria retirar o benzodiazepínico.

PARTE II - PORTUGUÊS

O fragmento de notícia a seguir aborda a economia alemã no ano de 2005.

Especialistas recomendam ações alemãs

Muitos investidores profissionais estão otimistas quanto as ações e a economia da Alemanha de forma geral, apesar dos desfavoráveis dados macroeconômicos. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no último trimestre do ano passado. A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos, de 0,6%, até este quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o ministro de Economia e Trabalho da Alemanha, Wolfgang Klement, advertia que o desemprego registraria novos recordes em fevereiro deste ano. Dito e feito. [...]

Disponível em:

<<http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=29874>>. Acesso em: 3 ago. 2009.

29 - Das afirmações seguintes:

I. Os dados macroeconômicos citados no texto reforçam a previsão dos especialistas sobre a economia alemã.

II. A expressão “dito e feito” permite supor que em fevereiro de 2005 o nível de desemprego realmente aumentou, conforme o previsto.

III. O vocábulo “anêmicos” (linha 5), no contexto significa “fraquíssimos”.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens II e III.
- E) Apenas o item III está correto.

30 - Na frase “A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos [...]”, que elemento é modificado pela palavra em destaque?

- A) economia
- B) Europa
- C) crescimento
- D) maior
- E) ritmos

As questões 31 a 33 referem-se ao texto seguinte:

A pesca

o anil
o anzol
o azul

o silêncio
o tempo
o peixe

a agulha
vertical
mergulha

a água
a linha
a espuma

o tempo
o peixe
o silêncio

a garganta
a âncora
o peixe

a boca
o arranco
o rasgão

aberta a água
aberta a chaga
aberto o anzol

aquélneo
ágil-claro
estabanado

o peixe
a areia
o sol.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. *A implosão da mentira (e outros poemas)*.

São Paulo: Global, 2007. p. 44-45.

31 - Das afirmações seguintes:

I. Nesse poema, a sequência de versos procura reproduzir as ações envolvidas no ato de pescar, embora, haja apenas um verbo empregado.

II. As classes de palavras predominantes no poema são artigos e substantivos e estes fazem com que as ações sejam sugeridas, insinuadas.

III. Considerando que cada estrofe ou conjunto de estrofes representa um momento da pescaria, podemos afirmar que a “figgada” encontra-se na 3ª, 4ª e 5ª estrofes.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

32 - A “âncora” no poema, representa metaforicamente que elemento?

- A) a agulha
- B) o anzol
- C) o anil
- D) o peixe
- E) a garganta

33 - Das afirmações seguintes:

I. A penúltima estrofe é formada apenas por adjetivos.

II. É possível afirmar que “aquilíneo”, no contexto, remete a “de forma aquosa”.

III. Os vocábulo “ágil” e “estabanado” remetem a ideia de movimento e são importantes no poema para suprir a ausência de verbos.

- A) Estão corretos apenas itens I e II.
- B) Estão corretos apenas itens I e III.
- C) Estão corretos apenas itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

A questão 34 refere-se a tira seguinte:



BROWNE, Dik. *Folha de S.Paulo*, 30 nov. 2002.

34 - A preposição “DE” estabelece qual relação entre as palavras cão e guarda na fala de Hagar e de Eddie?

- A) Respectivamente, finalidade e lugar.
- B) Respectivamente, meio e posse.
- C) Respectivamente, finalidade e posse.
- D) Respectivamente, causa e posse.
- E) Respectivamente, finalidade e meio.

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



35 - Na fala do motorista no último quadrinho, “BACH” constitui uma figura de linguagem denominada:

- A) hipérbole
- B) eufemismo
- C) personificação
- D) zeugma
- E) metonímia


36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) A testemunha precisou o local do crime.
- B) A funcionária visa o passaporte de maneira certa.
- C) Nós preferimos abacate a melão como sobremesa.
- D) Paguei o vigia noturno.
- E) O fato de você não ir implica outras consequências.

37 - Identifique a alternativa que apresenta erro de concordância nominal.

- A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim de tudo.
- B) O professor passou aos alunos os exercícios o mais fáceis possível.
- C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático da vida.
- D) Todos perceberam que elas estavam bastante desassossegadas.
- E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos.

38 - Na tira seguinte identificamos um exemplo de:



LAERTE. *Classificados*. São Paulo: Devir, 2001. p. 28. Livro 1.

- A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- D) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- E) Oração subordinada adverbial concessiva.

39 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são paroxítonos:

- A) cateter – filantropo – cânon
- B) fórceps – ciclope – austero
- C) ínterim – pegada – ibero
- D) libido – clímax – ureter
- E) âmbar – nobel – meteorito

40 - Nas frases:

O país da Escócia é belíssimo.

O povo da Escócia é generoso.

A admiração pela Escócia me fez retornar ao país.

Identificamos a função sintática dos termos destacados, respectivamente, em:

- A) aposto, complemento nominal, adjunto adnominal
- B) adjunto adnominal, aposto, complemento adnominal
- C) complemento nominal, aposto, adjunto adnominal
- D) complemento nominal, adjunto adnominal, aposto
- E) aposto, adjunto adnominal, complemento nominal